

Số: 66 /TB-VTL

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

Về tình hình bệnh lở cổ rễ, héo rũ vi khuẩn và bệnh khảm lá thuốc lá phát triển mạnh tại các tỉnh trồng thuốc lá phía Nam

1. TÌNH HÌNH BỆNH HẠI THUỐC LÁ (01 - 12/02/2026)

- Vùng Gia Lai: Hiện nay, bệnh khảm lá do virus, lở cổ rễ và héo rũ vi khuẩn đang phát triển mạnh tại vùng trồng thuốc lá Gia Lai, đặc biệt gây hại nặng trên giống thuốc lá K326. Trong đó:

+ Diện tích thuốc lá do Chi nhánh thuốc lá Bến Tre quản lý, bệnh lở cổ rễ, héo rũ vi khuẩn và khảm lá do virus gây hại nhẹ, một số ruộng bị gây hại mức độ trung bình.

+ Diện tích thuốc lá do Chi nhánh Công ty Cổ phần Hòa Việt quản lý, bệnh lở cổ rễ, héo rũ vi khuẩn và khảm lá do virus gây hại nhẹ, một số ruộng trồng giống K326 bị gây hại nhẹ đến trung bình.

+ Diện tích thuốc lá do các đơn vị khác đầu tư và hộ nông dân trồng giống K326 phát đang bị bệnh lở cổ rễ, héo rũ vi khuẩn và bệnh khảm lá do virus gây hại mức độ trung bình đến nặng, nhiều ruộng bị gây hại rất nặng và ít có khả năng cho thu hoạch.

Các loại sâu bệnh khác gây hại không đáng kể.

- Vùng Tây Ninh: Bệnh khảm lá thuốc lá xuất hiện với tỷ lệ bệnh dưới 10%, một số ruộng bị gây hại trên 10%. Các loại sâu bệnh khác gây hại không đáng kể.

2. DỰ BÁO SÂU BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG (15 - 28/2/2026)

Căn cứ vào tình hình thời tiết và sâu bệnh hại trên đồng ruộng, giai đoạn phát triển của cây thuốc lá, giống thuốc lá và lịch sử vùng trồng, dự báo một số bệnh hại chính tại các vùng trồng thuốc lá phía Nam như sau:

Vùng Gia Lai: Bệnh lở cổ rễ, héo rũ vi khuẩn và bệnh khảm lá do virus tiếp tục phát triển mạnh trên đồng ruộng, đặc biệt gây hại nặng đến rất nặng trên giống thuốc lá K326. Đối với giống PVH2343, bệnh xuất hiện ít và gây hại không đáng kể.

Vùng Tây Ninh: Bệnh khảm lá thuốc lá tiếp tục phát triển trên đồng ruộng với mức độ gây hại nhẹ đến trung bình, một số ruộng thuốc lá có thể bị gây hại trung bình đến nặng.

Các loại sâu bệnh khác xuất hiện và gây hại không đáng kể đến nhẹ.

3.2. Đề xuất biện pháp phòng chống

Trong thời gian tới, đề nghị các đơn vị sản xuất thuốc lá phía Nam tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chỉ đạo và hướng dẫn nông dân phun thuốc phòng chống bệnh lở cổ rễ, héo rũ vi khuẩn và bệnh khảm lá do virus kịp thời, hạn chế bệnh gây hại nặng đến rất nặng trong thời gian tới. Các biện pháp phòng chống chính như sau:

- **Bệnh virus (Khảm lá thuốc lá, xoắn lá thuốc lá...):** Để đạt hiệu quả phòng bệnh virus cao nhất cần phun thuốc phòng bệnh sớm trước khi triệu chứng xuất hiện trên cây.

Tiến hành phun 3 lần, mỗi lần cách nhau 7 ngày bằng thuốc Hobyto 200WP + Amygen-DM. Phun thuốc ướt đều các lá, đặc biệt các lá phía trên.

Khi bệnh xuất hiện trên đồng ruộng phun cấp thuốc Hobyto 200WP + Amygen-DM từ 3 - 4 lần kết hợp với thuốc trừ côn trùng môi giới (Rệp thuốc lá, bọ phấn trắng...). Trong đó, phun lần 2 cách lần 1 khoảng 3 ngày, các lần khác cách nhau 5 - 6 ngày. Mỗi bình phun bổ sung một chén nhỏ đạm.

Thuốc trừ côn trùng môi giới: Confidor 100SL (*Imidacloprid*), Vitarko 40 WG (*Chlorantraniliprole* + *Thiamethoxam*)....

- **Bệnh lở cổ rễ và héo rũ vi khuẩn:** Nhờ tiêu hủy cây bệnh, không để ruộng thuốc lá quá ẩm ướt. Bệnh xuất hiện, phun thuốc phòng chống 2 - 3 lần cách nhau 5 ngày bằng cấp thuốc Mikcide 1.5SL (*Tetramycin*) + Rovia 420SC (*Pyrimethanil*). Khi phun thuốc cần nói rộng béc phun, phun dạng tia nước và phun ướt đậm gốc thân sao cho thuốc ngấm xuống vùng rễ.

Nơi nhận:

- Ban Kỹ thuật & CN - TCT (để phối hợp chỉ đạo);
- Cty Cphan Hoà Việt (để phối hợp chỉ đạo);
- Lãnh đạo Viện (để biết);
- CN thuốc lá Tây Ninh và Gia Lai;
- CN Cty Thuốc lá Bến Tre tại Gia Lai;
- Lưu: VT, SH.



Nguyễn Văn Vân