TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
VIỆN THUỐC LÁ

Số: 95a /TB-VTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh gây hại thuốc lá từ ngày 01 - 15/3/2026 và dự báo sâu bệnh từ ngày 16 - 31/3/2026 cho các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc

1. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1.1. Tình hình thời tiết từ ngày 01 - 15/3/2026 cho các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc

Hầu hết các ngày có mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, một số ngày trưa chiều hửng nắng. Chiều tối và sáng sớm có sương mù và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ trung bình dao động 19 - 21°C, nhiệt độ cao nhất 29°C và thấp nhất 15°C. Độ ẩm không khí cao, trung bình từ 75 - 95%.

1.2. Dự báo thời tiết từ ngày 16 - 31/3/2026 cho các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc

Hầu hết các ngày có mây, có mưa và mưa rào vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Riêng các ngày 21 - 23/3 có mưa vài nơi và 29 - 31/3 có mưa vừa và mưa rải rác kèm theo dông. Nhiệt độ trung bình dao động 22 - 25°C, nhiệt độ cao nhất: 27 - 30°C và thấp nhất: 18 - 20°C, độ ẩm không khí từ 75 - 86% (Cao Bằng có độ ẩm không khí: 77 - 86% và Lạng Sơn: 70 - 80%) và lượng mưa 70 - 90 mm.

2. TÌNH HÌNH SÂU BỆNH GÂY HẠI THUỐC LÁ

Vùng Cao Bằng: Cây thuốc lá đang ở giai đoạn 14 - 22 lá. Riêng trà thuốc lá trồng sớm đã thu hoạch được 2 - 3 lần. Sâu xanh và rệp thuốc lá gây hại không đáng kể, với tỷ lệ hại dưới 4%. Bệnh khảm lá thuốc lá (TMV) xuất hiện với tỷ lệ bệnh dao động 5 - 7% và gây hại chủ yếu trên giống thuốc lá địa phương. Một số ruộng thuốc lá trồng giống địa phương bị bệnh TMV gây hại nặng. Đối với các giống thuốc lá GL9, GL10, D65 thì TMV gây hại không đáng kể. Bệnh khảm lá dưa chuột (CMV), chết gân mạng lưới (PVY) và xoăn lá thuốc lá (TLCV) gây hại không đáng kể (< 1%). Bệnh đốm vòng và đốm mắt cua phát sinh gây hại nhẹ với tỷ lệ bệnh < 10%. Bệnh thối gốc, đen thân, héo rũ vi khuẩn và thối rỗng thân bắt đầu xuất hiện rải rác trên đồng ruộng.

Vùng Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ): Cây thuốc lá đang ở giai đoạn 12 - 18 lá. Sâu xanh, rệp thuốc lá và bệnh virus (TMV, CMV, TLCV và TSWV) gây hại không đáng kể, với tỷ lệ bệnh dưới 1%. Đối với giống thuốc lá GL7, TMV ít gây hại. Bệnh đốm vòng xuất hiện với tỷ lệ bệnh dưới 10%. Bệnh thối gốc bắt đầu xuất hiện rải rác trên đồng ruộng.

Vùng Lạng Sơn: Cây thuốc lá đang ở giai đoạn 8 - 14 lá. Sâu xanh và rệp thuốc lá gây hại không đáng kể, với tỷ lệ hại dưới 2%. Bệnh do TMV và PVY xuất hiện với tỷ lệ bệnh dưới 1%. Riêng khu vực xã Vạn Linh, TMV xuất hiện dưới 10%. Bệnh đốm vòng và đốm mắt cua gây hại nhẹ, với tỷ lệ bệnh dưới 5%. Riêng các trà thuốc lá trồng vụ Đông xuân 2025 - 2026 tại xã Vũ Lăng, Hưng Vũ,… thuộc huyện Bắc Sơn cũ bị bệnh khảm lá thuốc lá gây hại từ mức độ trung bình đến nặng.

Để phòng chống kịp thời bệnh virus và bệnh đốm vòng, đốm mắt của phát triển trên đồng ruộng, các Chi nhánh sản xuất thuốc lá nguyên liệu thuộc Công ty Cổ phần Ngân Sơn và Chi nhánh Viện Thuốc lá tại Cao Bằng đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phun thuốc phòng chống nhằm ngăn chặn bệnh lây lan, gây hại nặng trên đồng ruộng.

3. DỰ BÁO SÂU BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG (Ngày 16 - 31/3/2026)

Căn cứ vào tình hình thời tiết, kết quả điều tra sâu bệnh, giai đoạn phát triển của cây thuốc lá, giống thuốc lá và lịch sử vùng trồng, dự báo sâu bệnh phát sinh gây hại ở các vùng trồng thuốc lá phía Bắc như sau:

3.1. Dự báo sâu bệnh gây hại thuốc lá

- Bệnh virus (TMV, CMV, TLCV, PVY...): Trong thời gian tới, bệnh virus tiếp tục phát triển tại các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc, trong đó, bệnh virus gây hại mức độ nhẹ ở vùng trồng thuốc lá Cao Bằng và gây hại nhẹ đến trung bình tại vùng Thái Nguyên và Lạng Sơn.

- Bệnh đốm vòng, đốm mắt cua và bệnh phấn trắng tiếp tục phát triển trên đồng ruộng trong thời gian tới. Trong đó, bệnh phát triển mạnh và gây hại mức độ nhẹ đến trung bình, có khả năng gây hại nặng tại Cao Bằng và Thái Nguyên; gây hại mức độ không đáng kể đến nhẹ ở vùng trồng thuốc lá Lạng Sơn.

- Bệnh thối gốc, đen thân, héo rũ vi khuẩn và bệnh thối rỗng thân sẽ xuất hiện và gây hại thuốc lá trong thời gian tới. Trong đó, vùng Cao Bằng và Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ) cần đề phòng bệnh gây hại nặng hơn vùng Lạng Sơn.

- Sâu xanh, sâu khoang và rệp thuốc lá gây hại không đáng kể đến nhẹ.

3.2. Đề xuất biện pháp phòng chống

Để phòng chống bệnh hiệu quả cần phun thuốc phòng sớm trước khi bệnh xuất hiện trên đồng ruộng. Biện pháp phòng chống một số bệnh gây hại chủ yếu trên đồng ruộng trong thời gian tới như sau.

- Bệnh virus gây hại thuốc lá:

+ Các trà thuốc lá có trên 16 - 18 lá và bắt đầu thu hoạch không cần phun thuốc phòng chống bệnh.

+ Các trà thuốc lá dưới 14 lá cần phun thuốc phòng bệnh 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 ngày. Phun thuốc ướt đều các lá, đặc biệt phun kỹ các lá phía trên.

+ Thuốc phòng bệnh: Cặp thuốc phòng chống virus Hobyo 200WP (*Moroxydine hydrochloride + Copper acetate*) + Amygen - DM.

- Bệnh đốm vòng, đốm mắt cua và bệnh phấn trắng: Trong thời gian tới, thời tiết các tỉnh phía Bắc nhiều mây, có sương mù và sương mù rải rác, có mưa và mưa nhỏ rải rác thuận lợi cho bệnh phát triển và gây hại trên đồng ruộng, do đó, đề nghị các Chi nhánh sản xuất thuốc lá nguyên liệu phía Bắc cần tăng cường hướng dẫn nông dân phun thuốc phòng bệnh 2 lần, mỗi lần cách nhau 5 ngày. Phun thuốc ướt đều các lá trên cây, đặc biệt phun kỹ các lá phía dưới.

Thuốc phòng chống bệnh: Cặp thuốc Mikcide 1.5SL (*Tetramycin*) + Rovia 420SC(*Pyrimethanil*) hoặc Ridomil Gold 68WP (*Metalaxyl-M (Mefenoxam)* + *Mancozeb*), Man Xanh (Mancozeb 80%),…

- Bệnh thối gốc, đen thân, héo rũ vi khuẩn và bệnh thối rỗng thân thường phát triển mạnh trên đồng ruộng trong giai đoạn thu hoạch, do vậy, để hạn chế bệnh xuất hiện và gây hại cần phun thuốc phòng bệnh sau khi thu hoạch lần 2. Tiến hành phun thuốc phòng bệnh 2 lần cách nhau 5 - 6 ngày và 3 lần khi bệnh xuất hiện trên đồng ruộng. Phun thuốc ướt đậm gốc thân từ vị trí thân thu hoạch lần 2 sao cho thuốc ngấm xuống vùng gốc rễ. Khi phun thuốc cần nới rộng béc phun sao cho phun dạng tia nước.

- Sâu xanh, sâu khoang và rệp thuốc lá: Tiếp tục theo dõi diễn biến sâu hại trên đồng ruộng và chủ yếu bắt sâu thủ công, chỉ phun thuốc BVTV khi sâu xanh và sâu khoang gây hại > 10% và rệp thuốc lá >10% với mật độ trên 50 con/lá.

Thuốc BVTV phòng chống: Sâu xanh và sâu khoang: Angun 5wg (*Emamectin Benzoate*); Rệp thuốc lá, bọ phấn trắng và bọ trĩ: Confidor 100SL *(Imidacloprid)* hoặc Vitarko 40 WG (*Chlorantraniliprole + Thiamethoxam*)….

Nơi nhận:
- Ban Kỹ thuật và Công nghệ- TCT (để phối hợp chỉ đạo);
- Cty Cổ phần Ngân Sơn (để phối hợp chỉ đạo);
- Lãnh đạo Viện (để biết);
- CN thuốc lá Thái Nguyên và Lạng Sơn;
- CN Viện Thuốc lá tại Cao Bằng;
- Lưu: VT, SH.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆN THUỐC LÁ

Nguyễn Văn Vân