

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2026

Tình hình sâu bệnh gây hại thuốc lá từ ngày 15 - 28/02/2026 và dự báo sâu bệnh từ ngày 01 - 15/3/2026 cho các tỉnh trồng thuốc lá phía Nam

1.1. Tình hình thời tiết từ ngày 15 - 28/02/2026

- Vùng Tây Ninh: Ngày nắng, có 2 ngày mưa vừa đến mưa to với lượng mưa dao động 30 - 45mm. Nhiệt độ trung bình dao động 27 - 28°C, nhiệt độ cao nhất 35°C và thấp nhất 23°C.

- Vùng Gia Lai: Chiều tối và đêm có mây, có mưa và mưa rào rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ trung bình dao động 23 - 24°C, nhiệt độ cao nhất 30°C và thấp nhất 19°C, độ ẩm không khí từ 50 - 70% và lượng mưa 10 - 30mm.

- Vùng Tây Ninh: Chiều tối và đêm có mưa và mưa rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ trung bình 28 - 30°C, nhiệt độ cao nhất 34°C và thấp nhất 25°C, độ ẩm không khí từ 40 - 70% và lượng mưa 5 - 20mm.

- Vùng Gia Lai: Cây thuốc lá đang ở giai đoạn 18 - 22 lá, riêng trà thuốc lá trồng sớm đã thu hoạch lần 1. Sâu xanh và sâu khoang gây hại không đáng kể, với tỷ lệ hại dưới 2%. Bệnh khảm lá và xoắn lá thuốc lá gây hại nhẹ, với tỷ lệ bệnh dưới 2%. Bệnh héo rũ vi khuẩn và lở cổ rễ gây hại nhẹ đến trung bình (tỷ lệ bệnh $\leq 3\%$). Riêng khu vực xã Phú Thiện, có khoảng 8,5ha thuốc lá trồng giống K326 bị nhiễm bệnh khảm lá thuốc lá với tỷ lệ bệnh trên 75%.

- Vùng Tây Ninh: Cây thuốc lá có 22 - 24 lá và đã thu hoạch lần 1. Sâu xanh và sâu khoang gây hại không đáng kể ($< 1\%$). Bệnh khảm lá thuốc lá xuất hiện trên đồng ruộng với tỷ lệ bệnh từ 15 - 20% và gây hại mức độ nhẹ.

Cuối tháng 2/2026, vùng trồng thuốc lá phía Nam xuất hiện mưa to trái vụ đã ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây thuốc lá ở một số khu vực thoát nước kém tại Gia Lai và Tây Ninh. Hầu hết các cây thuốc lá ở những ruộng thoát nước kém bị héo đã ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây.

Căn cứ vào tình hình thời tiết, kết quả điều tra sâu bệnh, giai đoạn phát triển của cây thuốc lá, giống thuốc lá và lịch sử vùng trồng, dự báo sinh vật hại chính tại các vùng trồng thuốc lá phía Nam như sau:

3.1. Dự báo sâu bệnh gây hại thuốc lá vùng trồng thuốc lá Tây Ninh và Gia Lai

+ **Bệnh virus (Bệnh khảm lá, xoắn lá thuốc lá...)**: Hiện nay, hầu hết các trà thuốc lá tại Gia Lai và Tây Ninh có 18 - 24 lá và đã thu hoạch lần 1, do đó dự báo các bệnh virus xuất hiện và gây hại không đáng kể đến nhẹ trong thời gian tới.

+ **Bệnh đen thân, lở cổ rễ, bệnh héo rũ vi khuẩn và thối rỗng thân**: Cuối tháng 2/2026, các vùng trồng thuốc lá Tây Ninh và Gia Lai xuất hiện mưa vừa, mưa to và gây ngập lụt các ruộng thuốc lá thoát nước kém. Cho nên, dự báo trong những ngày tới, bệnh héo rũ vi khuẩn, thối rỗng thân, đen thân và bệnh lở cổ rễ sẽ phát triển nhanh và có khả năng gây hại mức độ trung bình đến mạnh, đặc biệt là các khu ruộng thuốc lá thoát nước kém.

+ **Sâu xanh và sâu khoang** gây hại không đáng kể trong thời gian tới.

3.2. Đề xuất biện pháp phòng chống

- **Bệnh virus (Khảm lá thuốc lá, xoắn lá thuốc lá...)**: Do các trà thuốc lá tại Tây Ninh và Gia Lai đạt từ 18 - 24 lá và đã thu hoạch lần 1, cho nên trong thời gian tới tiếp tục theo dõi diễn biến bệnh trên đồng ruộng, không tiếp xúc giữa cây bệnh và cây khỏe trong quá trình thu hoạch nhằm hạn chế bệnh lây lan nhanh trên đồng ruộng. Chú ý, nên thu hoạch cây khỏe trước sau đó thu hoạch cây bệnh.

- **Bệnh đen thân, lở cổ rễ, héo rũ vi khuẩn và bệnh thối rỗng thân**: Kiểm tra đồng ruộng định kỳ, vệ sinh tiêu hủy cây bệnh triệt để nhằm giảm thiểu nguồn bệnh lây nhiễm trên đồng ruộng.

+ Đối với các khu ruộng không bị ngập úng nước cần phun thuốc phòng chống khi bệnh bắt đầu xuất hiện trên đồng ruộng (tỷ lệ bệnh dưới 0,5%) kết hợp biện pháp hạn chế tưới nhiều nước.

+ Đối với các khu ruộng bị ngập/úng nước, cần thoát nước nhanh và phun thuốc phòng bệnh 2 lần cách nhau 5 - 6 ngày sau khi cây thuốc lá hồi phục bằng một trong các thuốc sau: Cặp thuốc Mikcide 1.5SL (Tetramycin) + Rovia 420SC (Pyrimethanil), Ridomil Gold 68WP (Metalaxyl-M (Mefenoxam) + Mancozeb)...

Biện pháp phun thuốc: Khi phun thuốc cần nới rộng béc phun, phun dạng tia nước và phun thuốc ướt đậm gốc thân sao cho thuốc ngấm xuống vùng rễ.

- **Biện pháp khắc phục cây thuốc lá bị héo do ngập úng**: Thoát nước nhanh, không để cây thuốc lá bị ngập úng lâu (quá 24 giờ). Sau khi thoát nước, cây phục hồi nhẹ cần phun phân bón lá kích cây và rễ phát triển, tuyệt đối không tưới hoặc bón phân hóa học. Sau khi cây phục hồi tiến hành phun thuốc phòng chống bệnh thối rễ do nấm và vi khuẩn.

- **Sâu xanh và sâu khoang**: Tiếp tục theo dõi diễn biến sâu xanh, sâu khoang xuất hiện trên đồng ruộng và chỉ phun thuốc phòng chống khi sâu xuất hiện trên 10%.

Thuốc BVTV phòng chống sâu xanh: Angun 5WG (Emamectin Benzoate); Rệp thuốc lá và bọ phấn trắng: Confidor 100SL (Imidacloprid), Vitarko 40 WG (Chlorantraniliprole + Thiamethoxam)....

Nơi nhận:

- Ban Kỹ thuật & CN - TCT (để phối hợp chỉ đạo);
- Cty Cphân Hoà Việt (để phối hợp chỉ đạo);
- Lãnh đạo Viện (để biết);
- CN thuốc lá Tây Ninh và Gia Lai;
- CN Cty Thuốc lá Bến Tre tại Gia Lai;
- Lưu: VT, SH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Vân