

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh gây hại thuốc lá từ ngày 01 - 15/4/2025 và dự báo sâu bệnh từ ngày 16 - 30/4/2025 cho các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc

1. Diễn biến thời tiết và sâu bệnh gây hại thuốc lá từ ngày 01 - 15/4/2025

1.1. Diễn biến thời tiết của các vùng trồng thuốc lá phía Bắc

Hầu hết các ngày trời nắng, ít mưa và khô hạn, riêng các ngày 12 - 14/4 có mưa rào, mưa rải rác và mưa nhỏ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ trung bình từ 18 - 22°C, nhiệt độ trung bình cao nhất: 26 - 29°C và thấp nhất: 14 - 17°C.

1.2. Tình hình sâu bệnh gây hại thuốc lá

- *Vùng Cao Bằng*: Cây thuốc lá trồng sớm đã thu hái được 4 - 5 lần và trà sau thu hái 1 - 2 lần. Sâu xanh, sâu khoang và rệp thuốc lá gây hại không đáng kể, với tỷ lệ hại dưới 1%. Bệnh khảm lá thuốc lá (TMV), khảm lá dưa chuột (CMV), xoắn lá thuốc lá (TLCV), chết hoại gân mạng lưới (PVY) và bệnh héo đóm lá (TSWV) gây hại chủ yếu trên các giống thuốc lá địa phương, với tỷ lệ bệnh từ 1 - 8% và mức độ gây hại nhẹ. Đối với các giống thuốc lá GL7, GL9 và D65, các bệnh virus gây hại không đáng kể đến nhẹ (<1%). Bệnh thối rỗng thân và bệnh phấn trắng xuất hiện rải rác trên đồng ruộng.

- *Vùng Bắc Kạn*: Cây thuốc lá trồng sớm đã thu hái 2 - 3 lần và trà trồng sau có 14 - 16 lá. Sâu xanh, sâu khoang và rệp thuốc lá gây hại không đáng kể. Bệnh do TMV, CMV, TLCV, PVY và TSWV gây hại chủ yếu ở các giống thuốc lá địa phương, với tỷ lệ bệnh dưới 4% và gây hại mức độ không đáng kể đến nhẹ; trên các giống thuốc lá GL7 và C9-1, các bệnh virus gây hại không đáng kể (<1%).

- *Vùng Chi Lăng - Lạng Sơn*: Cây thuốc lá trồng sớm đang ở giai đoạn 18 - 24 lá và bắt đầu thu hoạch; trà trồng muộn có 15 - 16 lá. Sâu xanh, rệp thuốc lá và bệnh đóm lá thời tiết gây hại không đáng kể. Các bệnh virus (PVY, TMV, CMV, TLCV và TSWV) xuất hiện với tỷ lệ bệnh dao động 1 - 4%. Trong đó, tại xã Y Tịch, các bệnh virus gây hại với tỷ lệ bệnh 3 - 4%; xã Hòa Bình, Vạn Linh và Bằng Hữu: 1 - 2%; Các xã khác, bệnh xuất hiện rải rác với tỷ lệ bệnh dưới 1%.

- *Vùng Bắc Sơn - Lạng Sơn*: Cây thuốc lá trồng sớm đã thu hoạch lần 1 - 2 và trà trồng sau có 16 - 18 lá. Sâu xanh và rệp thuốc lá gây hại không đáng kể. Các bệnh virus (TMV, CMV, TLCV, PVY và TSWV) phát triển mạnh và gây hại nặng trên các giống thuốc lá địa phương trồng vụ sớm với tỷ lệ bệnh dao động 20 - 35% và nhiều ruộng thuốc lá bị nhiễm bệnh nặng (50 - 80%). Nguyên nhân bệnh phát triển mạnh trên đồng ruộng là do vụ thuốc lá Đông 2024 - 2025 trồng xen với vụ thuốc lá Xuân 2025. Đối với các trà thuốc lá trồng chính vụ và muộn có 15 - 18 lá được phòng chống kịp thời nên bệnh virus gây hại nhẹ đến trung bình, với tỷ lệ bệnh dưới 5%.



Để hạn chế bệnh virus phát triển mạnh trên đồng ruộng, các Chi nhánh sản xuất thuốc lá phía Bắc đã tăng cường kiểm tra đồng ruộng và hướng dẫn nông dân phun thuốc phòng chống bằng cặp thuốc Hobbyo 200WP (*Moroxydine hydrochloride* + *Copper acetate*) + Amygen - DM (*Amylase*). Hiện nay, hầu hết các ruộng thuốc lá nhiễm bệnh virus đã được xử lý thuốc Hobbyo 200wp từ 1 - 3 lần nên bệnh đã dừng phát triển, lây lan trên đồng ruộng, và cây thuốc lá phát triển bình thường.

2. Dự báo thời tiết, sâu bệnh và biện pháp phòng chống

2.1. Dự báo thời tiết cho các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc

Dự báo thời tiết 30 ngày (15/4 - 16/5/2025)

Từ 15 - 22/4, thời tiết các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc ngày nắng, một số ngày xuất hiện nắng nóng, ít mưa và khô hanh, nhiệt độ trung bình cao nhất đạt 36°C và thấp nhất: 20°C, và độ ẩm không khí: 40%. Từ ngày 23/4 - 16/5, trời có mây, có mưa và mưa rải rác, riêng các ngày 27 - 28/4 và 6 - 11/5 có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ trung bình cao nhất đạt 29°C và thấp nhất: 23°C, độ ẩm không khí: 70% và lượng mưa khoảng 130mm.

Dự báo thời tiết 15 ngày (16 - 30/4/2025)

Những ngày đầu và giữa, ngày nắng, một số ngày xuất hiện nắng nóng, không mưa và khô hanh. Những ngày tiếp theo, trời có mây, có mưa và mưa rải rác, riêng các ngày 23 - 24/4 và 27 - 28/4 có thể xuất hiện mưa rào. Nhiệt độ trung bình từ 25 - 26°C, nhiệt độ trung bình cao nhất: 32°C và thấp nhất: 20°C, độ ẩm không khí: 50 - 65% và lượng mưa: 50 - 60mm.

2.2. Dự báo sâu bệnh gây hại thuốc lá và biện pháp phòng chống

Căn cứ vào tình hình thời tiết, kết quả điều tra sâu bệnh, giai đoạn phát triển của cây thuốc lá và lịch sử vùng trồng, dự báo sâu bệnh phát sinh gây hại cho các vùng trồng thuốc lá phía Bắc như sau:

- **Sâu xanh, rệp thuốc lá và sâu khoang** gây hại không đáng kể đến nhẹ ở các vùng trồng thuốc lá phía Bắc trong 15 ngày tới.

Biện pháp phòng chống: Tiếp tục theo dõi diễn biến sâu xanh, sâu khoang và rệp thuốc lá xuất hiện trên đồng ruộng và sử dụng biện pháp bắt sâu thủ công, chỉ sử dụng thuốc hóa học khi sâu xanh và sâu khoang gây hại trên 10%, và rệp trên 20% với mật độ rệp 50 con/lá.

Một số thuốc phòng chống sâu hại: Sâu xanh: Agun 5WG (*Emamectin benzoate*), Abavec gold 9.99EC (*Abamectin* + *Emamectin benzoate*) và Rholam Super 50WG (*Emamectin benzoate* + *Matrine*). Rệp thuốc lá: Confidor 100SL (*Imidacloprid*), Actara 25 WG (*Thiamethoxam*), Buccas 120WP (*Buprofezin* + *Fenobucard* + *Thiamethoxam*), Caymangold 33WP (*Acetamiprid* và *Imidacloprid*).

- **Bệnh khảm lá thuốc lá (TMV), khảm lá dưa chuột (CMV), xoắn lá thuốc lá (TLCV) và bệnh héo đóm lá (TSWV) tiếp tục phát triển và gây hại tại các vùng trồng thuốc lá phía Bắc trong thời gian tới. Trong đó:**

Vùng Cao Bằng và Bắc Kạn: Bệnh virus gây hại không đáng kể đến nhẹ;

Vùng Chi Lăng và Bắc Sơn - Lạng Sơn: Bệnh virus tiếp tục phát triển và gây hại thuốc lá ở các tỉnh phía Bắc. Trong đó, bệnh gây hại nhẹ ở các tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn; gây hại mức độ nhẹ đến nặng trên trà thuốc lá trồng chính vụ và muộn (14 - 18 lá) tại Bắc Sơn và Chi Lăng - Lạng Sơn.

Biện pháp phòng chống: Để hạn chế các bệnh virus phát triển mạnh trên đồng ruộng, kính đề nghị các Chi nhánh sản xuất thuốc lá phía Bắc, đặc biệt là Chi nhánh Công ty cổ phần Ngân Sơn tại Bắc Sơn và Lạng Sơn tăng cường kiểm tra đồng ruộng và chỉ đạo nông dân phun thuốc phòng chống bệnh kịp thời.

Các biện pháp phòng chống các bệnh virus gây hại, cụ thể như sau:

Vùng Cao Bằng và Bắc Kạn: Hiện nay, hầu hết các trà thuốc lá đã ngắt ngọn, diệt chồi và thu hoạch, cho nên không cần biện pháp phòng chống các bệnh virus trong thời gian tới.

Vùng Chi Lăng và Bắc Sơn - Lạng Sơn

Trà thuốc lá trồng sớm đã ngắt ngọn và bắt đầu thu hoạch nên không cần biện pháp phòng chống các bệnh virus trong thời gian tới;

Trà thuốc lá đang trong giai đoạn sinh trưởng mạnh, có 15 - 16 lá, đề nghị Chi nhánh Công ty cổ phần Ngân Sơn tại Lạng Sơn và Bắc Sơn tăng cường kiểm tra đồng ruộng và hướng dẫn nông dân phun thuốc phòng chống, phun từ 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 4 - 5 ngày, và phun thuốc ướt đều các lá trên cây. Biện pháp phun thuốc phòng chống các bệnh virus gây hại thuốc lá:

+ Phòng chống bệnh TMV: Khuyến cáo nông dân phun thuốc phòng chống TMV bằng cặp thuốc Hoby 200WP (*Moroxydine hydrochloride* + *Copper acetate*) và Amygen-DM (*Amylase*).

+ Phòng chống bệnh do CMV, TLCV, PVY và TSWV: Khuyến cáo nông dân phun thuốc phòng chống bằng cặp thuốc Hoby 200WP (*Moroxydine hydrochloride* + *Copper acetate*) và Amygen-DM (*Amylase*), kết hợp thuốc trừ côn trùng môi giới truyền bệnh (Confidor 100SL (*Imidacloprid*), Vitarko 40 WG (*Chlorantraniliprole* + *Thiamethoxam*), Caymangold 33WP (*Acetamiprid* và *Imidacloprid*).

- Bệnh thối rỗng thân và héo rũ vi khuẩn: Trong thời gian tới, thời tiết các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc có nắng nóng và mưa, đặc biệt từ giai đoạn cuối tháng 4 trở đi sẽ thuận lợi cho bệnh thối rỗng thân và héo rũ vi khuẩn phát triển và gây hại mạnh hơn các vùng trồng thuốc lá khác.

Biện pháp phòng chống: Để hạn chế bệnh thối rỗng thân và héo rũ vi khuẩn trong thời gian tới, đề nghị các Chi nhánh sản xuất thuốc lá phía Bắc tăng cường kiểm tra đồng ruộng và phát hiện bệnh gây hại sớm. Khi bệnh bắt đầu xuất hiện cần phun thuốc phòng chống bằng thuốc Mikcide 1.5 SL (*Tetramycin 1.5ml/L*). Phun thuốc ướt đậm gốc thân và thân lên đến 1/2 cây, bao gồm gốc thân đã thu hoạch lá.

- **Bệnh đốm vòng, đốm mắt cua và bệnh phân trắng** tiếp tục phát sinh gây hại trong 15 ngày tới với mức độ gây hại nhẹ.

Biện pháp phòng chống: Tiếp tục theo dõi diễn biến bệnh xuất hiện trên đồng ruộng và chỉ phun thuốc phòng chống khi tỷ lệ bệnh trên 10%. Tiến hành phun thuốc 2 lần, mỗi lần cách nhau 5 - 6 ngày và phun thuốc ướt đều các lá phía dưới của cây.

Một số thuốc phòng chống bệnh: Thuốc phòng bệnh: COC 85WP hoặc Copper Chloruloxi 30WP (*Copper Oxychloride*), phun khu bệnh chưa xuất hiện hoặc bắt đầu xuất hiện; Thuốc trừ bệnh: BAVIZEB 75WP Manxanh (Mancozeb), Avatop 60WG (*Azoxystrobin + Dimethomorph*).

Nơi nhận:

- Ban Kỹ thuật và CN - TCT (để phối hợp chỉ đạo);
- Cty Cphần Ngân Sơn (để phối hợp chỉ đạo);
- Lãnh đạo Viện (để biết);
- CN thuốc lá Bắc Kạn, Lạng Sơn và Bắc Sơn;
- CN Viện Thuốc lá tại Cao Bằng;
- Lưu: VT, SH.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Vân