

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh gây hại thuốc lá từ ngày 01 - 15/01/2025 và dự báo sâu bệnh từ ngày 16 - 31/01/2025 cho các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc

1. Diễn biến thời tiết và sâu bệnh gây hại thuốc lá từ ngày 01 - 15/01/2025

1.1. Diễn biến thời tiết của các vùng trồng thuốc lá phía Bắc

Đêm và sáng trời rét, rét đậm và rét hại, ban ngày trời nắng, không mưa và khô hạn. Nhiệt độ trung bình dao động 10 - 14°C, cao nhất: 22 - 24°C và thấp nhất: 5 - 8°C, và độ ẩm không khí: 35 - 67%.

1.2. Tình hình sâu bệnh gây hại thuốc lá

- *Vùng Cao Bằng*: Trà thuốc lá trồng sớm đang ở giai đoạn 4 - 8 lá và trồng sau có 3 - 4 lá. Sâu xám, sâu xanh, rệp thuốc lá, bệnh khảm lá thuốc lá (TMV) và khảm lá dưa chuột (CMV) xuất hiện rải rác. Trên các giống thuốc lá địa phương, TMV và CMV xuất hiện cục bộ theo ruộng với tỷ lệ bệnh dưới 3%. Bệnh đốm lá thời tiết gây hại không đáng kể. Chi nhánh Viện Thuốc lá tại Cao Bằng đã hướng dẫn nông dân vệ sinh tiêu hủy cây bệnh (TMV và CMV), sử dụng cây giống khỏe trồng dặm và phun thuốc phòng bệnh.

- *Vùng Bắc Kạn và Lạng Sơn (Bắc Sơn, Chi Lăng và Văn Quan)*: Cây thuốc lá trồng sớm (vào giai đoạn 20 - 30/12/2024) đang phục hồi sinh trưởng và trà sau đang trồng ra ruộng sản xuất. Sâu xám và bệnh đốm lá thời tiết gây hại không đáng kể.

2. Dự báo thời tiết, sâu bệnh và biện pháp phòng chống

2.1. Dự báo thời tiết 15 và 30 ngày cho các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc

- *Dự báo thời tiết 30 ngày (16/01 - 15/02/2025)*: Từ ngày 16 - 25/01, chiều tối và sáng sớm có mây, trời rét, rét đậm và rét hại, ngày nắng và không mưa, nhiệt độ trung bình dao động 16 - 17°C, nhiệt độ cao nhất: 24°C và thấp nhất: 9°C và độ ẩm không khí: 45 - 55%. Từ ngày 26/01 - 15/2, trời nhiều mây, có mưa và mưa rải rác, trời rét, nhiệt độ trung bình từ 14 - 15°C, nhiệt độ cao nhất: 21°C và thấp nhất: 11°C, độ ẩm không khí: 75 - 82% và lượng mưa 50 - 60mm.

- *Dự báo thời tiết 15 ngày (16 - 31/01/2025)*: Từ ngày 16 - 25/01, chiều tối và sáng sớm trời rét, rét đậm và rét hại, ngày nắng và khô hạn. Từ ngày 25/01 trở đi, trời nhiều mây, có mưa và mưa rải rác. Trời rét. Nhiệt độ trung bình 17°C, nhiệt độ cao nhất: 23°C và thấp nhất: 12°C, độ ẩm không khí: 55 - 65% và lượng mưa: 20 - 30mm.

2.2. Dự báo sâu bệnh gây hại thuốc lá và biện pháp phòng chống từ 16 - 31/01/2025

Căn cứ vào tình hình thời tiết, kết quả điều tra sâu bệnh, giai đoạn phát triển của cây thuốc lá và lịch sử vùng trồng, dự báo sâu bệnh phát sinh gây hại cho các vùng trồng thuốc lá phía Bắc như sau:

- **Sâu xám, sâu xanh và rệp thuốc lá** gây hại không đáng kể đến nhẹ ở các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc trong 15 ngày tới.

Biện pháp phòng chống: Tiếp tục theo dõi diễn biến sâu hại xuất hiện trên đồng ruộng, và chỉ phun thuốc phòng chống khi sâu xám gây hại trên 1%, rệp thuốc lá > 10% với mật độ trên 10 con/lá và sâu xanh: > 5%. Khi cây con bị sâu xám gây hại tiến hành chọn cây giống khỏe trồng dặm.

Thuốc BVTV phòng chống: Thuốc Alfacua 10EC (*Alpha-cypermethrin*), Cymerin 25EC (*Cypermethrin*), Angun 5wg (*Emamectin Benzoate*)...

- **Bệnh khảm lá do TMV và CMV** sẽ gây hại không đáng kể đến nhẹ tại vùng trồng thuốc lá Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn.

Biện pháp phòng chống: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phát hiện bệnh xuất hiện sớm. Khi bệnh xuất hiện tiến hành vệ sinh tiêu hủy cây bệnh và sử dụng cây giống khỏe trồng dặm. Trong đó:

Bệnh do TMV: Những khu vực có lịch sử nhiễm bệnh và trồng các giống thuốc lá địa phương cần phun thuốc phòng bệnh bằng thuốc Ditacin 2SL (*Ningnanmycin*), phun 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 - 6 ngày khi bệnh bắt đầu xuất hiện trên đồng ruộng (tỷ lệ bệnh dưới 1%). Nếu bệnh tiếp tục phát triển mạnh với tỷ lệ bệnh > 1% nên sử dụng thuốc Hoby 200WP (*Moroxydine hydrochloride + Copper acetate*), phun 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 - 6 ngày.

Đối với CMV: Bệnh bắt đầu xuất hiện (< 1%), nhưng rệp thuốc lá, là côn trùng môi giới truyền bệnh chưa xuất hiện tiến hành vệ sinh cây bệnh và sử dụng cây giống sạch bệnh trồng dặm. Nếu rệp trưởng thành và rệp non xuất hiện phổ biến cần phun hỗn hợp thuốc Ditacin 2SL/Hoby 200WP với thuốc trừ rệp thuốc lá bằng thuốc Confidor 100SL (*Imidacloprid*) hoặc Vitarko 40 WG (*Chlorantraniliprole + Thiamethoxam*).

Nơi nhận:

- Ban Kỹ thuật và CN - TCT (để phối hợp chỉ đạo);
- Cty Cphần Ngân Sơn (để phối hợp chỉ đạo);
- Lãnh đạo Viện (để biết);
- CN thuốc lá Bắc Kạn, Lạng Sơn và Bắc Sơn;
- CN Viện Thuốc lá tại Cao Bằng;
- Lưu: VT, SH.

