

THÔNG BÁO

Tình hình sâu bệnh gây hại thuốc lá từ ngày 16 - 31/3/2026 và dự báo sâu bệnh từ ngày 01 - 15/4/2026 cho các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc

1. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1.1. Tình hình thời tiết từ ngày 16 - 31/3/2026 cho các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc

Hầu hết các ngày có mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, đặc biệt cuối tháng 3 có mưa vừa kèm theo dông và xuất hiện mưa đá tại Cao Bằng và Thái Nguyên. Nhiệt độ trung bình 21°C, nhiệt độ cao nhất 30°C và thấp nhất 18°C. Độ ẩm không khí dao động 75 - 95%.

1.2. Dự báo thời tiết từ ngày 01 - 15/4/2026 cho các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc

Hầu hết các ngày có mây, chiều tối và sáng có mưa và mưa rải rác và dông, trưa chiều hửng nắng, một số ngày có thể xuất hiện nắng nóng. Riêng các ngày 4 - 5/4 và 12 - 15/4 có thể xuất hiện mưa rào. Nhiệt độ trung bình dao động 25 - 28°C, nhiệt độ cao nhất: 35°C và thấp nhất: 22°C, độ ẩm không khí 65 - 82%, độ ẩm ban đêm trên 80% và lượng mưa 50 mm.

2. TÌNH HÌNH SÂU BỆNH GÂY HẠI THUỐC LÁ

Vùng Cao Bằng: Cây thuốc lá đang ở giai đoạn 22 - 26 lá và đã thu hoạch lần 2 - 3. Sâu xanh, sâu khoang và rệp thuốc lá gây hại không đáng kể, với tỷ lệ hại dưới 1%. Bệnh khảm lá thuốc lá (TMV), khảm lá dưa chuột (CMV) gây hại không đáng kể. Bệnh đốm vòng gây hại mức độ không đáng kể đến nhẹ, với tỷ lệ bệnh từ 5 - 14%. Bệnh thối gốc, đen thân, héo rũ vi khuẩn và thối rỗng thân xuất hiện rải rác trên đồng ruộng. Chi nhánh Viện Thuốc lá tại Cao Bằng đã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng chống bệnh đốm vòng bằng cặp thuốc Mikcide 1.5SL (*Tetramycin*) + Rovia 420SC (*Pyrimethanil*) nhằm hạn chế bệnh gây hại nặng trên đồng ruộng.

Vùng Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ): Cây thuốc lá đang ở giai đoạn 18 - 22 lá và đã thu hái lần 1. Sâu xanh, rệp thuốc lá và bệnh virus (TMV, CMV, PVY, TLCV và TSWV) gây hại không đáng kể, với tỷ lệ bệnh dưới 1%. Bệnh đốm vòng gây hại không đáng kể đến nhẹ, với tỷ lệ trung bình dao động 1 - 12%. Bệnh thối gốc, đen thân, héo rũ vi khuẩn và thối rỗng thân xuất hiện rải rác trên đồng ruộng. Công ty Cổ phần Ngân Sơn Chi nhánh Thái Nguyên đã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng chống bệnh đốm vòng bằng cặp thuốc Mikcide 1.5SL (*Tetramycin*) + Rovia 420SC (*Pyrimethanil*) nhằm hạn chế bệnh gây hại nặng trên đồng ruộng.

Vùng Lạng Sơn: Cây thuốc lá trồng tại xã Vũ Lăng và Hưng Vũ, tỉnh Lạng Sơn đang ở giai đoạn 12 - 14 lá; xã Vạn Linh và Bằng Mạc có 14 - 16 lá. Sâu xanh, sâu khoang và rệp thuốc lá gây hại không đáng kể. Bệnh virus (TMV, PVY, CMV) gây hại nhẹ với tỷ lệ hại dưới 10%. Bệnh đốm vòng gây hại không đáng kể đến nhẹ, với tỷ lệ bệnh < 10%. Để hạn chế bệnh virus gây hại mạnh trên đồng ruộng, Công ty Cổ phần Ngân Sơn Chi



nhánh Lạng Sơn tăng cường công tác phòng chống bệnh virus bằng cặp thuốc Hoby 200WP (*Moroxydine hydrochloride* + *Copper acetate*) + Amygen - DM.

3. DỰ BÁO SÂU BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG (Ngày 01 - 15/4/2026)

Căn cứ vào tình hình thời tiết, kết quả điều tra sâu bệnh, giai đoạn phát triển của cây thuốc lá, giống thuốc lá và lịch sử vùng trồng, dự báo sâu bệnh phát sinh gây hại ở các vùng trồng thuốc lá phía Bắc như sau:

3.1. Dự báo sâu bệnh gây hại thuốc lá

- **Bệnh thối gốc, đen thân, héo rũ vi khuẩn và bệnh thối rỗng thân:** Trong thời gian tới, các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc xuất hiện nắng, nắng nóng xen kẽ mưa rất thuận lợi cho bệnh phát triển và có thể gây hại nặng, đặc biệt là vùng trồng thuốc lá Cao Bằng và Thái Nguyên.

- **Bệnh đốm vòng, đốm mắt cua và bệnh phấn trắng** tiếp tục phát triển và gây hại trên đồng ruộng trong thời gian tới. Cụ thể: Bệnh sẽ phát triển nhanh, gây hại mức độ nhẹ đến trung bình và có khả năng gây hại nặng, đặc biệt là vùng Cao Bằng và Thái Nguyên.

- **Bệnh virus (TMV, CMV, TLCV, PVY...):** Trong thời gian tới, cây thuốc lá tại các vùng trồng phía Bắc đạt từ 16 lá đến thu hoạch lần 3 - 4, do đó dự báo bệnh virus sẽ gây hại không đáng kể đến nhẹ, ít ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng thuốc lá.

- **Sâu xanh, sâu khoang và rệp thuốc lá** gây hại không đáng kể đến nhẹ.

3.2. Đề xuất biện pháp phòng chống

Biện pháp phòng chống một số bệnh gây hại chủ yếu trên đồng ruộng trong thời gian tới như sau.

- **Bệnh thối gốc, đen thân, héo rũ vi khuẩn và bệnh thối rỗng thân** thường phát triển mạnh trên đồng ruộng trong giai đoạn thu hoạch, do vậy, để hạn chế bệnh xuất hiện và gây hại cần phun thuốc phòng bệnh sau khi thu hoạch lần 1 - 2. Tiến hành phun thuốc phòng bệnh 2 lần cách nhau 5 - 6 ngày và 3 lần khi bệnh xuất hiện trên đồng ruộng.

Kỹ thuật phun thuốc: Phun thuốc ướt đậm gốc thân từ vị trí thân thu hoạch sao cho thuốc ngấm xuống vùng gốc rễ. Khi phun thuốc cần nói rộng béc phun sao cho phun thuốc dạng tia nước.

Thuốc phòng chống bệnh: Để phòng chống bệnh thối thân, thối gốc do nấm và vi khuẩn nên phun cặp thuốc Mikcide 1.5SL (*Tetramycin*) + Rovia 420SC (*Pyrimethanil*) hoặc Ditacin 8SL+ Ridomil Gold 68WP (*Metalaxyl-M (Mefenoxam)* + *Mancozeb*).

- **Bệnh đốm vòng, đốm mắt cua và bệnh phấn trắng:** Trong thời gian tới, thời tiết các tỉnh phía Bắc nắng nóng xen kẽ mưa nhiều, đề nghị các Chi nhánh sản xuất thuốc lá nguyên liệu phía Bắc cần tăng cường hướng dẫn nông dân phun thuốc phòng bệnh 2 lần, mỗi lần cách nhau 5 ngày, đối với các ruộng bị bệnh phun 2 - 3 lần bằng một trong các loại thuốc sau: Cặp thuốc Mikcide 1.5SL (*Tetramycin*) + Rovia 420SC (*Pyrimethanil*) hoặc Ridomil Gold 68WP (*Metalaxyl-M (Mefenoxam)* + *Mancozeb*), Man Xanh (Mancozeb 80%),... Phun thuốc ướt đều các lá phía dưới và giữa của cây.

- **Bệnh virus gây hại thuốc lá:** Hiện nay, hầu hết các trà thuốc lá đang ở giai đoạn 16 lá đến thu hoạch, cho nên trong thời gian tới không cần phun thuốc phòng chống bệnh virus gây hại thuốc lá.

- **Sâu xanh, sâu khoang và rệp thuốc lá:** Tiếp tục theo dõi diễn biến sâu hại trên đồng ruộng và chủ yếu bắt sâu thủ công, chỉ phun thuốc BVTV khi sâu xanh và sâu khoang gây hại > 10% và rệp thuốc lá > 10% với mật độ trên 50 con/lá.

Thuốc BVTV phòng chống: Sâu xanh và sâu khoang: Angun 5wg (*Emamectin Benzoate*); Rệp thuốc lá, bọ phấn trắng và bọ trĩ: Confidor 100SL (*Imidacloprid*) hoặc Vitarko 40 WG (*Chlorantraniliprole + Thiamethoxam*)....

Nơi nhận:

- Ban Kỹ thuật và Công nghệ- TCT (để phối hợp chỉ đạo);
- Cty Cổ phần Ngân Sơn (để phối hợp chỉ đạo);
- Lãnh đạo Viện (để biết);
- Công ty CP Ngân Sơn CN Thái Nguyên và Lạng Sơn;
- CN Viện Thuốc lá tại Cao Bằng;
- Lưu: VT, SH.



Nguyễn Văn Vân

