

Số: 30 /TB-VTL

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2025

## THÔNG BÁO

**Tình hình sâu bệnh gây hại thuốc lá từ ngày 16 - 31/01/2025 và dự báo sâu bệnh từ ngày 04 - 18/02/2025 cho các tỉnh trồng thuốc lá phía Nam**

### 1. Diễn biến thời tiết và sâu bệnh gây hại thuốc lá từ ngày 16 - 31/01/2025

#### 1.1. Diễn biến thời tiết của các vùng trồng thuốc lá phía Nam

- *Vùng Gia Lai*: Chiều tối và sáng sớm có mây, ngày nắng và ít mưa. Nhiệt độ trung bình dao động 25 - 27°C, nhiệt độ cao nhất: 32°C và thấp nhất: 22°C, và độ ẩm không khí thấp, dưới 65%.

- *Vùng Tây Ninh*: Ngày nắng và ít mưa. Nhiệt độ trung bình: 28 - 29°C, nhiệt độ cao nhất: 35°C và thấp nhất: 24°C, và độ ẩm không khí thấp, dưới 60%.

#### 1.2. Tình hình sâu bệnh gây hại thuốc lá

- *Vùng Gia Lai*: Cây thuốc lá đang ở giai đoạn 18 - 22 lá. Sâu xanh, rệp thuốc lá, bọ phấn trắng và sâu khoang gây hại không đáng kể, với tỷ lệ bệnh dưới 1%. Bệnh xoắn lá thuốc lá (TLCV), khảm lá thuốc lá (TMV), khảm lá dưa chuột (CMV) và bệnh héo rũ vi khuẩn gây hại không đáng kể. Riêng khu vực trồng thuốc lá thuộc xã IaPeng, huyện Phú Thiện có khoảng 12 ha trồng giống K326 của 3 - 4 hộ dân bị nhiễm bệnh TMV với tỷ lệ bệnh 35%; và 3,5 ha thuốc lá nhiễm bệnh CMV với tỷ lệ bệnh 10%.

- *Vùng Tây Ninh*: Cây thuốc lá đã ngắt ngọn và diệt chồi. Sâu xanh, rệp thuốc lá, bọ phấn trắng, TMV, TLCV và ne ngọn xuất hiện rải rác trên đồng ruộng và gây hại không đáng kể.

### 2. Dự báo thời tiết, sâu bệnh và biện pháp phòng chống

#### 2.1. Dự báo thời tiết 15 và 30 ngày cho các tỉnh trồng thuốc lá phía Nam

*Dự báo thời tiết 30 ngày (từ 04/2 - 7/3/2025)*

- *Vùng Gia Lai*: Chiều tối và sáng sớm có mây, ngày nắng, riêng các ngày 13 - 15/2 có thể xuất hiện mưa và mưa rải rác. Nhiệt độ trung bình dao động 23 - 24°C, nhiệt độ cao nhất: 29°C và thấp nhất: 20°C, độ ẩm không khí thấp, từ 50 - 55% và lượng mưa: 20mm

- *Vùng Tây Ninh*: Chiều tối và sáng sớm có mây, ngày nắng, riêng các ngày 13 - 15/2 có thể xuất hiện mưa và mưa rải rác. Nhiệt độ trung bình: 27 - 28°C, nhiệt độ cao nhất: 32°C và thấp nhất: 24°C, độ ẩm không khí thấp, dao động 45 - 55% và lượng mưa: 30mm.

*Dự báo thời tiết 15 ngày (04 - 18/02/2025):*

- *Vùng Gia Lai*: Chiều tối và đêm có mây, trưa chiều giảm mây hứng nắng, riêng các ngày 13 - 15/2 có thể xuất hiện mưa và mưa rải rác. Nhiệt độ trung bình dao động 22 - 23°C, nhiệt độ cao nhất: 27 - 29°C và thấp nhất: 19 - 21°C, độ ẩm không khí: 50 - 55% và lượng mưa 20mm



- *Vùng Tây Ninh*: Chiều tối và sáng sớm có mây, ngày nắng, riêng các ngày 13 - 15/2 có thể xuất hiện mưa và mưa rải rác. Nhiệt độ trung bình: 26 - 27°C, nhiệt độ cao nhất: 30 - 32°C và thấp nhất: 23°C, độ ẩm không khí: 50 - 55% và lượng mưa: 30mm.

## 2.2. Dự báo sâu bệnh gây hại thuốc lá và biện pháp phòng chống từ 04 - 18/02/2025

Căn cứ vào tình hình thời tiết, kết quả điều tra sâu bệnh, giai đoạn phát triển của cây thuốc lá và lịch sử vùng trồng, dự báo sâu bệnh phát sinh gây hại cho các vùng trồng thuốc lá phía Nam như sau:

### 2.2.1. Vùng Gia Lai

- **Sâu xanh, rệp thuốc lá, sâu khoang và bọ phấn trắng** gây hại mức độ không đáng kể đến nhẹ ở vùng trồng thuốc lá Gia Lai trong 15 ngày tới.

Biện pháp phòng chống: Tiếp tục theo dõi diễn biến sâu hại trên đồng ruộng và chủ yếu sử dụng biện pháp bắt sâu thủ công, và chỉ phun thuốc phòng chống khi sâu xanh và sâu khoang gây hại trên 10%; rệp thuốc lá và bọ phấn trắng xuất hiện trên 10% với mật độ trên 50 con/lá.

Thuốc BTVT phun phòng chống: Sâu xanh: Angun 5WG (*Emamectin Benzoate*); Rệp thuốc lá và bọ phấn trắng: Confidor 100SL (*Imidacloprid*), Vitarko 40 WG (*Chlorantraniliprole + Thiamethoxam*)....

- **Bệnh ne ngọn, TLCV, CMV và TMV** gây hại không đáng kể, tuy nhiên cần đề phòng bệnh TMV và CMV phát triển mạnh hơn trên giống K326.

Biện pháp phòng chống: Hiện nay, cây thuốc lá vùng Gia Lai đã có 20 - 24 lá và chuẩn bị ngắt ngọn và diệt chồi, cho nên trong thời gian tới không cần biện pháp phòng chống bệnh ne ngọn, TLCV, CMV và TMV.

- **Bệnh thối rỗng thân và héo rũ vi khuẩn** phát sinh gây hại không đáng kể trong 15 ngày tới.

Biện pháp phòng chống: Tăng cường theo dõi diễn biến bệnh trên đồng ruộng, nếu bệnh xuất hiện cần vệ sinh tiêu hủy cây bệnh, hạn chế tưới nước tràn ruộng nhằm đảm bảo cho ruộng thuốc lá luôn khô ráo và hạn chế bệnh lây lan, và chỉ phun thuốc phòng chống khi bệnh gây hại trên 5% bằng thuốc YCHATOT 900SP (*Oxytetracycline hydrochloride + Streptomycin Sulfate*), Map Lotus 125WP (*Oxolinic acid & Streptomycin sulfate*)...

### 2.2.2. Vùng Tây Ninh

- **Sâu xanh, rệp thuốc lá, sâu khoang và bọ phấn trắng** gây hại không đáng kể trong thời gian tới ở vùng trồng thuốc lá Tây Ninh.

Biện pháp phòng chống: Hiện nay, vùng trồng thuốc lá Tây Ninh đã ngắt ngọn và diệt chồi, cho nên trong thời gian tới chủ yếu theo dõi diễn biến sâu hại trên đồng ruộng và không sử dụng thuốc BTVT phun phòng chống; Riêng sâu khoang chỉ phun thuốc phòng chống khi tỷ lệ gây hại trên 10% bằng thuốc Angun 5wg (*Emamectin Benzoate*).

- **Bệnh ne ngọn, TLCV, CMV và TMV** gây hại không đáng kể trong 15 ngày tới.

Biện pháp phòng chống: Hiện nay, cây thuốc lá vùng Tây Ninh đã ngắt ngọn và diệt chồi, cho nên không cần biện pháp phòng chống bệnh trong thời gian tới.

- **Bệnh thối rễ thân và héo rũ vi khuẩn** phát sinh gây hại không đáng kể trong 15 ngày tới.

Biện pháp phòng chống: Tương tự vùng trồng thuốc lá Gia Lai.

**Nơi nhận:**

- Ban Kỹ thuật và CN - TCT (để phối hợp chỉ đạo);
- Cty Cphân Hoà Việt (để phối hợp chỉ đạo);
- Lãnh đạo Viện (để biết);
- CN thuốc lá Tây Ninh và Gia Lai;
- CN Cty Thuốc lá Bến Tre tại Gia Lai;
- Lưu: VT, SH.

