

## THÔNG BÁO

**Tình hình sâu bệnh gây hại thuốc lá từ ngày 15 - 31/01/2025 và dự báo sâu bệnh từ ngày 04 - 18/02/2025 cho các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc**

### 1. Diễn biến thời tiết và sâu bệnh gây hại thuốc lá từ ngày 15 - 31/01/2025

#### 1.1. Diễn biến thời tiết của các vùng trồng thuốc lá phía Bắc

Đêm và sáng trời rét, rét đậm và rét hại, ban ngày trời nắng, một số ngày có mưa rào và mưa rải rác. Nhiệt độ trung bình dao động 12 - 15°C, cao nhất: 22 - 24°C và thấp nhất: 7 - 10°C, và độ ẩm không khí từ 45 - 75%.

#### 1.2. Tình hình sâu bệnh gây hại thuốc lá

- *Vùng Cao Bằng*: Trà thuốc lá trồng sớm đang ở giai đoạn 8 - 12 lá và trồng sau có 4 - 6 lá. Sâu xám gây hại không đáng kể. Bệnh khảm lá thuốc lá (TMV) và khảm lá dưa chuột (CMV) gây hại nhẹ trên các giống thuốc lá địa phương, với tỷ lệ bệnh < 3%, và ít gây hại với các giống thuốc lá GL9, GL7... Bệnh xoắn lá thuốc lá (TLCV) xuất hiện rải rác trên các giống thuốc lá. Cây thuốc lá nhiễm bệnh TMV, CMV, TLCV được nhổ tiêu hủy, sử dụng cây giống sạch bệnh trồng dặm và phun thuốc phòng chống.

- *Vùng Bắc Kạn và Bắc Sơn - Lạng Sơn*: Cây thuốc lá trồng sớm đang ở giai đoạn 3 - 4 lá và trồng sau đang phục hồi sinh trưởng. Sâu xám và bệnh đốm lá thời tiết gây hại không đáng kể. Bệnh khảm lá thuốc lá (TMV) xuất hiện rải rác trên đồng ruộng. Cây thuốc lá nhiễm TMV được nhổ tiêu hủy, trồng dặm và phun thuốc phòng chống.

- *Vùng Chi Lăng, Văn Quan và Hữu Lũng - Lạng Sơn*: Cây thuốc lá trồng sớm đang có 3 - 4 lá và trồng muộn đang phục hồi sinh trưởng. Sâu xám, bệnh đốm lá thời tiết và bệnh chết hoại gân lá (PVY) gây hại không đáng kể.

### 2. Dự báo thời tiết, sâu bệnh và biện pháp phòng chống

#### 2.1. Dự báo thời tiết 15 và 30 ngày cho các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc

- *Dự báo thời tiết 30 ngày (04/2 - 07/3/2025)*: Từ ngày 4/2 đến 5/2, ngày nắng và không mưa. Từ ngày 6/2 - 7/3, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, riêng ngày 17 - 18/2 sẽ xuất hiện mưa rào. Trời rét, rét đậm và các vùng núi cao xuất hiện rét hại. Nhiệt độ trung bình trong 30 ngày tới dao động 15 - 17°C, nhiệt độ cao nhất: 19°C và thấp nhất: 13°C, độ ẩm không khí: 80 - 85% và lượng mưa 60 - 90mm.

- *Dự báo thời tiết 15 ngày (4 - 18/02/2025)*: Từ ngày 04 - 5/02, chiều tối và sáng sớm trời rét, rét đậm và rét hại, ngày nắng và ít mưa. Từ ngày 06/02 trở đi, trời nhiều mây, có mưa và mưa rải rác, riêng ngày 17 - 18/2 có thể xuất hiện mưa rào. Trời rét, rét đậm và rét hại ở



những vùng núi cao. Nhiệt độ trung bình 13 - 15°C, nhiệt độ cao nhất: 17°C và thấp nhất: 11°C, độ ẩm không khí: 77 - 87% và lượng mưa: 40 - 50mm.

## 2.2. Dự báo sâu bệnh gây hại thuốc lá và biện pháp phòng chống từ 04 - 18/02/2025

Căn cứ vào tình hình thời tiết, kết quả điều tra sâu bệnh, giai đoạn phát triển của cây thuốc lá và lịch sử vùng trồng, dự báo sâu bệnh phát sinh gây hại cho các vùng trồng thuốc lá phía Bắc như sau:

- **Sâu xám, sâu xanh và rệp thuốc lá** gây hại không đáng kể đến nhẹ ở các tỉnh trồng thuốc lá phía Bắc trong 15 ngày tới.

Biện pháp phòng chống: Tiếp tục theo dõi diễn biến sâu hại xuất hiện trên đồng ruộng, và chỉ phun thuốc phòng chống khi sâu xám gây hại trên 1%, rệp thuốc lá > 10% với mật độ trên 10 con/lá và sâu xanh: > 5% cây nhiễm sâu. Khi cây con bị sâu xám gây hại tiến hành chọn cây giống khỏe trồng dặm.

Thuốc BVTV phòng chống: Thuốc Alfacua 10EC (*Alpha-cypermethrin*), Cymerin 25EC (*Cypermethrin*), Angun 5wg (*Emamectin Benzoate*)...

- **Bệnh khảm lá thuốc lá (TMV), khảm lá dưa chuột (CMV), bệnh xoắn lá thuốc lá (TLCV) và chết hoại gân lá (PVY)** xuất hiện và gây hại không đáng kể đến nhẹ tại vùng trồng thuốc lá Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn. Riêng vùng Cao Bằng cần đề phòng bệnh khảm lá do TMV và CMV phát triển mạnh hơn các vùng khác.

Biện pháp phòng chống: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện bệnh xuất hiện sớm và thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

+ Vệ sinh tiêu hủy cây bệnh và sử dụng cây giống khỏe trồng dặm.

+ Phòng chống bệnh khảm lá thuốc lá: Những khu vực có lịch sử nhiễm bệnh TMV và trồng các giống thuốc lá địa phương cần phun thuốc phòng bệnh bằng thuốc Ditacin 8SL (*Ningnanmycin*) khi TMV chưa xuất hiện. Nếu bệnh bắt đầu xuất hiện trên ruộng trồng tiến hành phun thuốc trừ bệnh bằng thuốc Hobbyo 200WP (*Moroxydine hydrochloride + Copper acetate*) + Amygen-DM (*Amylase*), phun 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 ngày và phun thuốc ướm đều các lá trên cây.

+ Phòng chống bệnh do CMV, TLCV và PVY – là bệnh virus lây lan qua côn trùng môi giới, trong đó: Rệp thuốc lá truyền bệnh CMV và PVY; bệnh xoắn lá thuốc lá: bọ phấn trắng: Những khu vực có lịch sử nhiễm bệnh cần phun thuốc phòng bệnh bằng thuốc Ditacin 8SL (*Ningnanmycin*) khi bệnh chưa xuất hiện. Nếu bệnh bắt đầu xuất hiện trên đồng ruộng tiến hành phun hỗn hợp thuốc Hobbyo 200WP + Amygen-DM (*Amylase*) + thuốc trừ côn trùng môi giới truyền bệnh (Confidor 100SL (*Imidacloprid*) hoặc Vitarko 40 WG (*Chlorantraniliprole + Thiamethoxam*)). Phun thuốc 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 ngày và phun thuốc ướm đều các lá trên cây.

- **Bệnh đốm lá thời tiết** phát sinh gây hại không đáng kể đến nhẹ.

Biện pháp phòng chống: Tiếp tục theo dõi diễn biến bệnh trên đồng ruộng, nếu bệnh đốm lá xuất hiện phổ biến kết hợp điều kiện thời tiết nhiều mây, âm u và có mưa nhỏ nhiều ngày cần phun thuốc phòng bệnh bằng các thuốc chứa gốc đồng, như COC 85WP, Copper Chloruloxi 30WP (*Copper Oxychloride*)... Phun 1 - 2 lần, mỗi lần cách nhau 5 - 6 ngày. Phun thuốc ướt đều các lá trên cây.

**Nơi nhận:**

- Ban Kỹ thuật và CN - TCT (để phối hợp chỉ đạo);
- Cty Cphan Ngân Sơn (để phối hợp chỉ đạo);
- Lãnh đạo Viện (để biết);
- CN thuốc lá Bắc Kạn, Lạng Sơn và Bắc Sơn;
- CN Viện Thuốc lá tại Cao Bằng;
- Lưu: VT, SH.

