

## THÔNG BÁO

**Tình hình sâu bệnh gây hại thuốc lá từ ngày 16 - 31/3/2026 và dự báo sâu bệnh từ ngày 01 - 15/4/2026 cho các tỉnh trồng thuốc lá phía Nam**

### 1. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

#### 1.1. Tình hình thời tiết từ ngày 16 - 31/3/2026

- Vùng Gia Lai: Ngày nắng, không mưa, nhiệt độ trung bình dao động 26 - 28°C, nhiệt độ cao nhất 36 - 38°C và thấp nhất 20 - 22°C. Độ ẩm thấp, dưới 60%.

- Vùng Tây Ninh: Ngày nắng, không mưa. Nhiệt độ trung bình dao động 28 - 29°C, nhiệt độ cao nhất 37°C và thấp nhất 24°C.

#### 1.2. Dự báo thời tiết từ ngày 01 - 15/4/2026

- Vùng Gia Lai: Hầu hết các ngày trời nắng, ít mưa, một số ngày xuất hiện nắng nóng. Riêng từ ngày 12 - 15/4 có thể xuất hiện mưa và mưa rải rác. Nhiệt độ trung bình dao động 28 - 29°C, nhiệt độ cao nhất 33 - 36°C và thấp nhất 22 - 23°C, độ ẩm không khí từ 40 - 50% và lượng mưa dưới 30mm.

- Vùng Tây Ninh: Hầu hết các ngày trời nắng, ít mưa, riêng ngày 14 - 15/4 có mưa rải rác. Nhiệt độ trung bình 30 - 32°C, nhiệt độ cao nhất 37 - 39°C và thấp nhất 25 - 26°C, độ ẩm không khí từ 40 - 60% và lượng mưa dưới 20mm.

### 2. TÌNH HÌNH SÂU BỆNH GÂY HẠI THUỐC LÁ

- Vùng Gia Lai: Cây thuốc lá đã thu hái được 3 - 5 lần. Sâu khoang, bệnh khảm lá thuốc lá và xoắn lá thuốc lá gây hại không đáng kể, với tỷ lệ bệnh dưới 1%. Bệnh héo rũ vi khuẩn và bệnh đen thân gây hại nhẹ, với tỷ lệ bệnh dưới 4%.

- Vùng Tây Ninh: Cây thuốc lá đã thu hoạch được 3 - 4 lần. Sâu xanh và sâu khoang gây hại không đáng kể. Bệnh khảm lá thuốc lá xuất hiện với tỷ lệ bệnh 15 - 20% và gây hại không đáng kể.

### 3. DỰ BÁO SÂU BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG (Ngày 01 - 15/4/2026)

Căn cứ vào tình hình thời tiết, kết quả điều tra sâu bệnh, giai đoạn phát triển của cây thuốc lá, giống thuốc lá và lịch sử vùng trồng, dự báo sinh vật hại chính tại các vùng trồng thuốc lá phía Nam như sau:

#### 3.1. Dự báo sâu bệnh gây hại thuốc lá vùng trồng thuốc lá Tây Ninh và Gia Lai

+ **Bệnh virus (Bệnh khảm lá, xoắn lá thuốc lá...)**: Hiện nay, hầu hết các trà thuốc lá tại Gia Lai và Tây Ninh đã thu hoạch lần 3 - 5, do đó dự báo các bệnh virus xuất hiện và gây hại không đáng kể trong thời gian tới

+ **Bệnh đen thân, lở cổ rễ, bệnh héo rũ vi khuẩn và thối rỗng thân** xuất hiện và gây hại không đáng kể đến nhẹ ở vùng trồng thuốc lá Tây Ninh và Gia Lai.

+ **Sâu khoang** gây hại không đáng kể trong thời gian tới.

### 3.2. Đề xuất biện pháp phòng chống

- **Bệnh virus (Khảm lá thuốc lá, xoắn lá thuốc lá...)**: Do các trà thuốc lá tại Tây Ninh và Gia Lai đã thu hoạch lần 3 - 5, cho nên tiếp tục theo dõi diễn biến bệnh trên đồng ruộng và không cần biện pháp phòng chống trong thời gian tới.

- **Bệnh đen thân, lở cổ rễ, héo rũ vi khuẩn và bệnh thối rỗng thân**: Kiểm tra đồng ruộng định kỳ, vệ sinh tiêu hủy cây bệnh, hạn chế tưới nhiều nước nhằm ngăn chặn bệnh lây lan, và chỉ phun thuốc phòng chống khi bệnh xuất hiện > 5% bằng cặp thuốc Mikcide 1.5SL (*Tetramycin*) + Rovia 420SC (*Pyrimethanil*). Phun 2 lần cách nhau 5 ngày. Khi phun thuốc cần nói rộng béc phun, phun dạng tia nước và phun thuốc ướt đậm gốc thân sao cho thuốc ngấm xuống vùng rễ.

- **Sâu khoang**: Tiếp tục theo dõi diễn biến của sâu khoang xuất hiện trên đồng ruộng và chỉ phun thuốc phòng chống khi sâu khoang gây hại trên 10%.

Thuốc BVTV phòng chống sâu khoang: Angun 5WG (*Emamectin Benzoate*)...

#### Nơi nhận:

- Ban Kỹ thuật & CN - TCT (để phối hợp chỉ đạo);
- Cty Cphần Hoà Việt (để phối hợp chỉ đạo);
- Lãnh đạo Viện (để biết);
- CN Cphần Hoà Việt tại Tây Ninh và Gia Lai;
- CN Cty Thuốc lá Bến Tre tại Gia Lai;
- Lưu: VT, SH.



Nguyễn Văn Vân